

NOTE SUR L'*AIRA CUPANIANA* GUSS., VAR. *INCERTA* CES., PASS. ET GIB.,
(GRAMINÉES).

PAR M^{lle} AIMÉE CAMUS.

L'*Aira Cupaniana* Guss. comprend en France deux variétés :

Var. *genuina* Briquet, Prodr. fl. corse, p. 98 (1910); *A. Cupaniana* Guss. *sensu stricto*. Épillets à une fleur aristée, l'autre mutique.

Très répandue dans la région méditerranéenne et en Corse.

Var. *incerta* Ces. Pass. et Gib., Comp. fl. it., p. 59 (1868); *A. Cupaniana* var. *breviaristata* Asch. et Gr. Syn. II, p. 284 (1899); var. *floculis utrinque aristatis* Parlat. Fl. it. I, p. 252 (1848). Épillets formés de deux fleurs aristées, à arêtes dépassant nettement les glumes, l'une souvent plus courte.

Cette variété, que M. Briquet considère comme rare en Corse, existe aussi dans le Midi de la France où sa présence ne paraît pas avoir été signalée jusqu'ici. La var. *incerta* semble plus rare que la var. *genuina*, nous l'avons vue provenant des localités suivantes :

Alpes-Maritimes : Menton (de Pomm., mai 1865); Saint-Martin-Vésubie (A. Camus). Var : Fréjus (Maire), Saint-Tropez, Grimaud, Ramatuelle, Gassin, assez abondante (G. et A. Camus), Hyères, le Fenouillet (Loret), Mourrières près de Toulon (Huet et Jacquin).

Hérault : Roquehaute (Duval-Jouve),

Aude : Narbonne (Pourret).